

Information om skadedjur



Information om skadedjur

Innehåll

Sida	
2-18	Djur i livsmedel
19-22	Djur i textilier
23-27	Djur som kan stickas, bitas och irritera
28-31	Djur i trävirke
32-36	Djur som bara bor i huset



Lasius niger

(latinskt namn)



Svartmyra

Biologi

Svartmyran är den vanligaste arten av myror i hus och trädgård. Den bygger bo i jorden, ofta under stenar, samt i husgrunder. Arbetare är 2,5-4,0 mm långa och svartbruna.

Skador

Myror lever bl a av sockerhaltiga substanser och kött, och kommer ofta in i bostäder på jakt efter föda. Myror kan genom sina bon underminera plattläggningar på altaner och dylikt. I gamla hus kan de förstöra rötskadat trä.




inspectera®

Dermestes lardarius

(latinskt namn)

Larven i olika stadier



Fläskängar

Biologi

6-10 mm lång, brunsvart med grå buksida och ett brett gråaktigt och svartfläckigt tvärband över täckvingarna.

Honan lägger 100-200 ägg. De brunsvarta, borstbäklädda larverna är glupska och snabbvuxna och kan förpuppa sig redan efter 1-2 månader.

De gnager sig då in i t ex trä och fiberplattor.

Fläskängern lever huvudsakligen av animalier men kan också äta vegetabilisk föda.

Skador

Skalbagge och larver kan angripa livsmedel i skafferi och andra förrådsutrymmen.

I lager av oberedda hudar och skinn, torkad fisk mm kan fläskängern också orsaka betydande skada.


Skador uppstår även när larven borrar sig in i exempelvis virke för att förpuppas.



inspectera®

Sitophilus granarius

(latinskt namn)



Kornvivel

Biologi

2,5-5 mm lång, ljusskygg brunsvart skalbagge som saknar flygförmåga. Känns lätt igen genom att huvudet är utdraget till en snabel (snyte). Utvecklingen sker dold inne i spannmålskärnor och tar från 5 veckor upp till 5 månader beroende på temperaturen. Honan gnager ett hål i kornet och i botten placeras ett ägg sedan täpps hålet igen med ett färglöst sekret. Varje hona lägger 100-200 ägg.

Skador

Kornviveln är vanligast i vete och korn. Den vita larven urholkar kärnorna helt. De vuxna skalbaggar gnager sönder kornen men lämnar äggbelagda korn orörda. Larvernas livsprocesser orsakar värmeutveckling, vilket i sin tur bidrar till mögel- och kondensbildning.




inspectera®

Tenebrio molitor

(latinskt namn)

Larvstadie



Mjölbagge

Biologi

12-18 mm lång, svartbrun skalbagge. Dess larv, "mjölmasken", är hårdskalig och kan bli 30 mm lång.

Varje hona lägger 150-200 klibbiga ägg. Larvstadiet varar oftast 8-12 månader vilket innebär att endast en generation utvecklas per år.

Arten är vanlig inomhus, men lever även ute i det fria.

Den trivs bäst i förrådsutrymmen som inte vädras eller rengörs regelbundet.

Skador

Larv och skalbagge äter och smutsar ner mjölprodukter, spannmål, fodermedel och dylikt.

Mjöl klumpar sig och luktar unket.



inspectera®

Ptinus fur

(latinskt namn)

Larvstadie



Tjuvbagge

Biologi

3-5 mm lång skalbagge med punktstrimmor på täckvingarna. Hanen, som är ljusbrun och smal, har väl utvecklade flygvingar. Honan är bredare och kullrigare, mörkare brun med ljusare tvärband på bakkroppen och saknar flygvingar. Hon producerar 20-60 ägg. Utvecklingstiden för varje generation är minst årslång. Skalbaggen trivs bäst i sval och inte allt för torr miljö.

Skador

Tjuvbaggen och dess larver är allätare och kan angripa spannmål, frövaror, kryddor, skinnvaror, insektssamlingar, herbarier, uppstoppade djur etc. I angripna lager finner man de tjockväggiga pupporna sittande på insidan av förpackningarna som ofta är helt perforerade. Varorna smutsas ner av skalbaggnas sekret.



inspectera®

Tinea granella

(latinskt namn)



Kornmal

Biologi

Vit- och brunfläckig fjäril med ca 12 mm mellan vingspetsarna. Honan lägger ca 100 ägg som klibbas fast utanpå kärnorna i spannmålsens ytskikt. De gulvita larverna blir upp till 10 mm långa. Förpuppningen sker bland spannmålen, men en del larver kryper också in i väggsspringor och andra gömslen och förpuppar sig där.

Skador

Spannmål, särskilt råg, men även klöverfrö, gräsfrö, kli, oljekakor och dylikt angrips av larverna som äter sig in i groddanlagen. Kärnorna äts sönder och spinns samman med larvens gryniga exkrementer till klumpar eller en enda sammanhängande filt.




inspectera®

Ephestia kuehniella

(latinskt namn)

Larven i olika stadier



Kvarnmott

Biologi

Fjärilens kropp är ca 10 mm lång och vingbredden 25 mm. Den är skiffergrå och svartpudrad med mörka oregelbundna tvärlinjer över framvingarna.

Bakvingarna är gråvita.

Honan lägger ca 200 ägg. Larverna är gulvita, ibland med inslag av rött eller grönt.

De blir som fullvuxna drygt 10 mm långa. De färdigbildade mottfjärilarna lever helt av den energi de samlat som larver. De är nattdjur som ofta sitter stilla under dagen.

Skador


Larverna äter, smutsar ner och spinner samman mjöl och grynprodukter. Genom att de filtrar ihop mjölet, kan transportrör och siktdukar täppas till och orsaka stopp.



inspectera®

Stegobium paniceum

(latinskt namn)



Brödbagge

Biologi

Rostbrun ca 3 mm lång skalbagge. Den fullvuxna skalbaggen äter inte och lever endast några få veckor. Honan lägger upp till 100 ägg. De mycket små nykläckta vita larverna är lätttrörliga och kan tränga in överallt. När brödbaggarna fortplantar sig försvinner deras tidigare ljusskygghet. I stället söker de sig fram i ljuset och är då lätta att upptäcka.

Skador


Larverna äter cirkelrunda hål i spannmålskorn, bageriprodukter, kryddor etc liksom i förpackningsmaterial av t ex papper.



inspectera®

Stegobium paniceum

(latinskt namn)



Brödbagge

Biologi

Rostbrun ca 3 mm lång skalbagge. Den fullvuxna skalbaggen äter inte och lever endast några få veckor. Honan lägger upp till 100 ägg. De mycket små nykläckta vita larverna är lätttrörliga och kan tränga in överallt. När brödbaggarna fortplantar sig försvinner deras tidigare ljusskygghet. I stället söker de sig fram i ljuset och är då lätta att upptäcka.

Skador

Larverna äter cirkelrunda hål i spannmålskorn, bageriprodukter, kryddor etc liksom i förpackningsmaterial av t ex papper.





inspectera®

Tribolium castaneum

(latinskt namn)

Larv



Kastanjebrun mjölbagge

Biologi

Roströd skalbagge, 3-4 mm lång. Honan lägger 300-600 ägg. Larverna är gulbruna och upp till 8 mm långa. Utvecklingstiden från ägg till skalbagge är i rumstemperatur ca 3-4 månader. Den har stort värmebehov.

Skador


Skalbagge och larver äter mjöl och mjölprodukter, bageriprodukter, torkad frukt, nötter mm. Finns ibland också i spannmål som sekundär skadegörare till kornvivel. Angripna produkter förorenas, mjöl klumpar sig och luktar unket och temperaturen stiger. På ytan av angripna partier kan man ofta finna rester efter larvernans hudömsningar.



inspectera®

Monomorium pharaonis

(latinskt namn)



Faraomyra

Biologi

Faraomyran är 1,5-2,0 mm lång och ljust gyllene till färgen. Arten har namnet till trots inget med specifikt Egypten att göra utan härkomsten är tropisk.

I Sverige kan den återfinnas i uppvärmda lokaler och bona byggs i mörka hålrum eller sprickor där temperaturen gärna får vara 27-30°C.

Förutom sötsaker kan Faraomyran livnära sig på köttvaror och ost varför den kan finnas i livsmedelslager, affärer, restauranger och bostäder.

Skador


Normalt sett är Faraomyran mer irriterande än farlig men i sjukhusmiljö kan den föra smitta genom att t ex leta sig in i sterila förpackningar.



inspectera®

Plodia interpunctella

(latinskt namn)



Indiskt mjölmott

Biologi

En förrådsskadeinsekt som utvecklas från ägg till larv till fjäril via ett förpuppningsstadie. Utvecklingen från ägg till vuxen fjäril går som snabbast vid 28°C och tar då 35 dagar. Under 18°C sker ingen utveckling.

Skador


Allvarlig förrådsskadeinsekt i varmare trakter som speciellt angriper torkad frukt, nötter och mandlar. Larverna kan förekomma i choklad samt i spannmål och dess produkter. Indiskt mjölmott i hemmen kommer vanligen från påse med nötter eller mandel.



inspectera®

Liposcelis divinatorius

(latinskt namn)



Dammlus

Biologi

Är trots sitt namn ingen lus utan tillhör gruppen stövsländor. 1-2 mm lång. De tål inte uttorkning och lever av mögelsvampar. Honan lägger ett par hundra ägg som på en månad kan vara färdigutvecklade vid gynnsamma förhållanden. Den lever av framför allt stärkelsehaltiga varor.

Skador


Dammlusen är inte skadlig för hälsan men kan vara orsak till reklamationer vilket kan bli kostsamt.



inspectera®

Blatta orientalis

(latinskt namn)



Orientalisk kackerlacka

Biologi

Hanen har väl utvecklade vingar men honan har endast kortare stumpar, men ingen av dem kan dock flyga. Hela honan är mörkt brun men hanen har ljus bruna ben och täckvingar.

De trivs vid 20-29°C.

Honan lägger ca 15 ägg i äggkapseln och bär den med sig under några dagar innan den läggs på en mörk skyddad plats. Efter några månader spricker kapseln och de små nymferna kommer ut.

Skador

Kackerlackor angriper alla slag av livsmedel.



De smutsar ner med sina exkrementer och utgör en hälsorisk genom att sprida virus och bakterier.



inspectera®

Periplaneta americana

(latinskt namn)



Amerikansk kackerlacka

Biologi

Denna art finns inte naturligt i Sverige men kommer ibland hit via t ex varutransporter och kan då överleva om de finner en varm och fuktig plats. Färgen är brun till gulbrun och vingarna är längre än kroppen. Äggen läggs i ett äggpaket som honan kan bära med sig fäst vid bakkroppsspetsen. Som alla kackerlackor är den allätare och lever gott av matrester och annat organiskt avfall.

Skador


Kackerlackor angriper alla slag av livsmedel. De smutsar ner med sina exkrementer och utgör en hälsorisk genom att sprida virus och bakterier.



inspectera[®]

Blatella germanica

(latinskt namn)



Tysk kackerlacka

Biologi

Ca 13 mm stor, gulbrun med två mörka längsgående band på halsskölden. Den befruktade honan bär omkring en äggkapsel i 4-5 veckor innan den lösgörs. Ungarna kommer fram nästan genast. Utvecklingstiden är totalt 2-3 månader. Tyska kackerlackan trivs bäst på mörka, varma och fuktiga platser. Den klättrar, till skillnad från andra arter, lätt på glatta lodräta ytor. Den har vingar men flyger ej.

Skador

Kackerlackor angriper alla slag av livsmedel, särskilt jästa och saftiga ämnen, samt papper och lädervaror. De smutsar ner med sina illaluktande, flytande exkrementer och sin mörkfärgade saliv och utgör även en hälsorisk genom att sprida virus och bakterier; t ex gulsot, polio och salmonella. Två på ryggsidan belägna stinkkörtlar sprider en karaktäristisk lukt.



inspectera®

Rattus norvegicus

(latinskt namn)



Brun råtta

Biologi

Brun råtta är den svåraste skadegöraren bland råttdjuren. Fullvuxen väger den 500-600g. De skarpa tänderna växer livet igenom och råttorna har därför behov av att gnaga på hårda material för att slipa ner tänderna och hålla dem skarpa. Honan kan få 6-7 kullar per år med i genomsnitt 8-10 ungar i varje kull.

Skador

Råttor smutsar ner och äter alla typer av mat- och fodervaror. De gnager på förpackningsmaterial, på byggnader, inredningsdetaljer och elektriska ledningar. De kan gå till anfall mot mindre husdjur som t ex kycklingar. Råttor överför direkt och indirekt många sjukdomar på människa och husdjur som t ex pest, triknos, salmonella och mul- och klövsjuka.



inspectera®

Mus musculus domesticus

(latinskt namn)



Husmus

Biologi

Husmusen finns över hela landet. Den väger fullvuxen 14-20g.

Pälsen på ryggsidan är gråbrun till gulbrun. Buken, liksom tassarna, är ljusare.

Tänderna är skarpa och växer under hela livet. Honan föder 4-6 kullar per år med 4-8 ungar i varje kull. Mössen har ringa behov av vatten och trivs därför också i extremt torra lokaler. De klarar också kyla bra.

Skador


Mössen äter av livsmedel och fodermedel men också på textilier, papper, läder etc och förorenar produkterna med sina exkrementer. Möss kan även överföra sjukdomar; t ex paratyfus och salmonella.



inspectera®

Attagenus pellio

(latinskt namn)



Pälsänger

Biologi

3,5-5,5 mm lång, brunsvart skalbagge med vita hårfläckar på täckvingarna och i halssköldens bakkant. Honan flyger på våren in i bostäder och lagerutrymmen för att lägga 40-50 ägg. Utvecklingstiden från ägg till skalbagge tar mer än ett år, ibland 2-3 år beroende på födans beskaffenhet.

Larven blir upp till 10 mm lång. Den är slank, avsmalnande bakåt och har en tilltryckt, gulbrun behåring.

Skador

Larverna angriper såväl förråd av livsmedel som textilier och pälsverk. Pälsverk avbetas fläckvis och i textilier av tyll äts runda hål. Heltäckande yllemattor är vanliga objekt för angrepp.



inspectera®

Attagenus gloriosae

(latinskt namn)



Vågbandad pälsängare

Biologi

Vågbandad pälsängare är köldkänslig men trivs bra i inomhusklimat och är i Sverige mer utbredd än *Attagenus pellio*.

Den förökar sig under hela året och kan hinna med tre generationer under ett år.

Skador

Larverna angriper såväl förråd av livsmedel som textilier och pälsverk.

Pälsverk avbetas fläckvis och i textilier av t ex ylle äts runda hål.

Heltäckande yllemattor är vanliga objekt för angrepp.



inspectera®

Tineola bisselliella

(latinskt namn)



Klädesmal

Biologi

Klädesmalen är 4-9 mm lång med glänsande, ockragula framvingar och ljusgula bakvingar. Honan lägger 100-200 ägg på textilier och larverna kommer fram efter ca 14 dagar. Larven lever inuti rör som den tillverkar av spinntrådar och från underlaget avgnagt material och exkrementkorn. Utvecklingstiden från ägg till fjäril är ca 3 månader i rumstemperatur där 3-4 generationer uppträder årligen.

Skador

De gulvita larverna äter hål i ylleytyger och andra textilier samt kaläter pälsar.



inspectera®

Djur som kan
stickas, bitas och irritera

Musca domestica

(latinskt namn)

Larven i olika stadier



Husfluga

Biologi

Husflugan är den vanligaste flugan. Den är svart och 7-8 mm lång. Den kan inte bitas utan har munnen utformad som en sugsnabel. Flugan kan endast tillgodogöra sig flytande föda, varför fasta ämnen först löses upp av saliven. De lägger sina ägg framför allt i gödsel, köksavfall och dylikt. Under gynnsamma förhållanden tar utvecklingen från larv till fluga endast ca 2 veckor.

Skador

Flugor är irriterande och obehagliga för människor och husdjur. De smutsar ner med sina exkrementer och kan sprida infektionssjukdomar.



inspectera®

Vespa vulgaris

(latinskt namn)



Geting

Biologi

11-20 mm lång getingart som är vanlig i hela landet. Känns lätt igen på sin svartgula teckning och karaktäristiska kroppsform. Gadden används för att döda byten och till försvar. Giftet, som är besläktat med ormgift, produceras i ett par körtlar.

Larverna livnär sig på fjärilslarver, smådjur, frukt och bär. Vuxna getingar lever av flytande näring. På våren grundas ettåriga samhällen av en övervintrad befruktad hona. De första medborgarna blir arbetare, under sommaren och hösten finner man även hanar och honor. I ett stort bo kan antalet getingar uppgå till ca 5000-6000 st.

Skador


Getingarna bygger bon i håligheter i träd, byggnader, murar etc. Deras stick är smärtsamma och är för överkänsliga personer mycket farliga.



inspectera®

Cimex lectularius

(latinskt namn)



Vägglus

Biologi

Tunn rödbrun kropp som är ca 5mm lång. Den kan inte flyga men klättra på lodräta väggar och även i taket om det inte är allt för slätt. Vägglusen kräver ett varmt och torrt klimat.

Vägglusen suger blod från människan och vägleds av värmestrålningen från huden. Den kan suga i sig upp till 7 gånger sin egen vikt i blod på mindre än 10 minuter. Mätt och fylld av blod parar den sig och kryper in något gömställe för att lägga ägg; upp till 200 st tills nästa gång det är dags för mat, vilket kan ta nästan två månader.

Skada

Det är givetvis obehagligt med vägglusens blodsugande och betten orsakar i de flesta fall kraftig klåda.



inspectera®

Djur som kan
stickas, bitas och irritera

Dermanyssus gallinae

(latinskt namn)



Fågelkvalster

Biologi

Fågelkvalstret lever i hönshus, duvslag och andra ställen där redan och bon finns. Honan lägger upp till 10 ägg åt gången men för varje gång måste hon suga nytt blod. Utvecklingen från ägg till vuxet kvalster tar ca 9 dagar. Kvalstret kan klara sig utan blod i 4 till 5 månader.

Skador

Fågelkvalster kan även bita människor och ge upphov till kliande utslag. När kvalstret är utsvultet kan det lämna fågelboet och komma in i hemmen. Tomma fågelbon i närhet till boningshus bör därför avlägsnas och man kan eventuellt bespruta mot ohyrn.




inspectera®

Djur som kan
stickas, bitas och irritera

Ctenocephalides canis

(latinskt namn)



Hundloppa

Biologi

Denna loppa, och även den snarlika Kattloppan (*Ctenocephalides felis*), är ovanlig men kan förekomma i södra Sverige. Äggen läggs på värdjuret.

Skador

Om värdjuret försvinner från hemmet kan de uthungrade lopporna angripa även människan men de kan inte lägga ägg på oss varför det inte blir fler generationer.




inspectera®

Djur som kan
stickas, bitas och irritera

Camponotus herculeanus

(latinskt namn)



Hästmyra

Biologi

Hästmyran är 6-12 mm lång och förekommer i så gott som hela landet. Födan består, liksom för de flesta myrarter, av socker och äggvitehaltiga ämnen. Hästmyran hör till de arter där en enda befruktad drottning kan grundlägga ett helt nytt samhälle.

Skador


Hästmyran bygger bo i rötskadat trä, gamla stubbar etc men även i friskt virke. Den kan ibland slå sig ned inomhus och kan då bli ett besvärligt skadedjur.



inspectera®

Hylotrupes bajulus

(latinskt namn)



Husbock

Biologi

Skalbaggen är 10-25 mm grå- eller brunaktig med två ljusare tvärband på täckvingarna. Larven är elfenbensfärgad med tydligt ledad kropp och blir 20-25 mm lång. Husbocken angriper virke inomhus och dess larver kan leva av gammalt torrt virke från barrträd. Honan lägger upp till 400 ägg djupt ner i veden i sprickor och springor. Efter några veckor kläcks larverna och borrar sig in i virket. Under larvernas utvecklingstid, som kan vara från 3 år till 10 år beroende på träets näringsinnehåll och temperatur, gnager de gångar i träets inre. Efter förvandlingen via puppa till vuxen skalbagge lämnar den virket via ett flyghål som larven har förberett. Flyghålet och borrarspånet är ofta det enda yttre synliga tecknet på att virket är angripet.

Skador

Larverna behöver värme för sin utveckling och därför är det framför allt trävirket på vindar i äldre hus, i de sydöstra delarna av Sverige som angrips. Larverna kan leva ostört under många års tid inne i träet utan att det syns några tecken eller hål utvändigt och därmed orsaka stora skador. Omfattande saneringar och reparationer krävs oftast.



inspectera®

Ernobius mollis

(latinskt namn)



Mjuk trägnagare

Biologi

En beklädnad av korta, tunna hår ger baggen en ljus, gulbrun färg och dess kropp är mjukare än hos de övriga trägnagararterna. Äggen läggs under barken på döda grenar eller timmer av barrträd.

Skador


Mjuk trägnagare är allmänt förekommande och vanlig där byggnadsvirke är helt eller delvis obarkat. Skadorna är dock endast ytliga och har ingen betydelse för bärigheten.



inspectera®

Anobium punctatum

(latinskt namn)



Strimmig trägnagare

Biologi

Kallas även dödsur och dess larv kallas trämask. Ca 5 mm lång. Baggarna gnager sig sommartid ut ur det angripna träet, flyger iväg och parar sig. Honan lägger äggen i springor, på ändträ eller ohyvlat virke och efter 3-4 veckor kläcks de och larverna gnager sig in i träet. Efter 2 år, eller mer beroende på temperatur, fuktighet och träslag, är larvens utveckling klar. Den trivs bäst vid en temperatur på 22-23°C och en luftfuktighet på minst 50%. Träets vattenhalt får inte understiga 11%.

Skador

Moderna bostäder är i allmänhet för torra för att den strimmiga trägnagaren skall trivas men trävaror i kallare och äldre byggnader kan bli allvarligt skadade av de gångar som larverna gnager. Man kan ofta se högar av gulaktigt bormjöl under angripet trä.



inspectera®

Callidium violaceum

(latinskt namn)



Blåhjon

Biologi

Äggen läggs i döende barrträd eller i timmerstockar med barken kvar och larverna lever sedan i lagret mellan bark och ved under 1-2 år innan den förpuppas och den färdiga skalbaggen kryper ut i det fria.

Skalbaggens kropp blir ca 10 mm lång och är vackert blå till tonen.

Skador

Eftersom larverna lever i lagret mellan bark och ved så blir inte skadorna särskilt allvarliga. Bästa sättet att undvika angrepp är att barka av virket.



inspectera®

Porcellio scaber

(latinskt namn)



Gråsugga

Biologi

Skiffergrått till gulgrått, platt kräftdjur på ca 15 mm. Uppträder i tvättstugor, källare och andra fuktiga platser. Den är allätare men lever framför allt av multnade växtämnen, t ex ruttnande trävirke och av svampmycel.

Skador


Gråsuggan orsakar sällan några större skador men upplevs som obehaglig. Den kan angripa lager av potatis, frukt, grönsaker mm och kan också skada växter i t ex växthus.



inspectera®

Forficula auricularia

(latinskt namn)



Tvestjärt

Biologi

Tvestjärten blir 10-16 mm lång och förekommer nästa överallt, utom i norra Norrland. Den trivs och förökar sig i växtlighet nära hus. Arten är ljusskygg och söker sig till springor i fönsterkarmar och dörrar, mellan kronblad i blommor eller andra gömställen. De parar sig på hösten. Ofta övervintrar en hane eller hona tillsammans, men tidigt på våren kastas hanen ut. Honan inrättar då jordhålan till yngelkammare där hon lägger sina ca 50 ägg. Tvestjärten är nära nog allätare.

Skador


Tvestjärter är mest till besvär under hösten. De kan uppträda i stor mängd och även invadera hus, vilket innebär en sanitär olägenhet. Utomhus kan de ibland skada prydsväxter.



inspectera®

Acheta domesticus

(latinskt namn)



Hussyrsa

Biologi

Vuxna syrsor är ca 20 mm långa och ljus gråbruna med svart i teckningen. Den kan både hoppa långt och flyga. Den vill ha värme varför den utomhus mest förekommer i Skåne på soptippar och gödselstackar. Inomhus kan den finnas i hela Sverige bara det är varmt, fuktigt och gärna mörkt. Syrsan kan livnära sig på nästan vad som helst men föredrar mjukare växt- och djurdelar

Skador


De är egentligen ganska harmlösa men de kan vara störande att höra hanarnas ljud som de åstadkommer genom att gnida täckvingarna mot varandra.



inspectera®

Lepisma saccharina

(latinskt namn)



Silverfisk / Nattsmyg

Biologi

Vinglös, ljusskygg, silverglänsande och kvick insekt som blir upp till 12 mm lång. Utvecklingstiden tar i rumstemperatur ca 1 år. De föredrar varma och fuktiga lokaler och man finner dem ofta i badrum och kök.

Skador

Silverfisken livnär sig på stärkelse och sockerhaltiga ämnen och finns därför ofta i bagerier och kvarnar. Den ger sig också på stärkelsehaltiga textilier, tapetklister, bokryggar, limmat papper mm.



inspectera®